

中華民國 98年

台中市衛生死因統計分析



台中市衛生局編印

中華民國99年9月

目 錄

表	名 頁	次
台中市/全國十大死亡原因		1
台中市主要死因死亡率 (圖)		2
台中市98年及97年主要死因死亡人數 (圖)		3
台中市男/女性十大死亡原因		4
台中市各區死亡人數按年齡別分		5
台中市十大死因年齡結構別死亡概況		6
台中市各區死亡人數按性別分		7
台中市各區死亡人數按死亡種類分		8
台中市中區十大死亡原因		9
台中市東區十大死亡原因		10
台中市西區十大死亡原因		11
台中市南區十大死亡原因		12
台中市北區十大死亡原因		13
台中市西屯區十大死亡原因		14
台中市南屯區十大死亡原因		15
台中市北屯區十大死亡原因		16
台中市/全國主要癌症死亡原因		17
台中市98年主要癌症死亡率 (圖)		18
台中市/全國98年主要癌症死亡率 (圖)		19
台中市男/女性癌症主要死亡原因		20
台中市男性98年與97年主要癌症死亡率 (圖)		21
台中市女性98年與97年主要癌症死亡率 (圖)		22
台中市及各區各年齡別意外事故與自殺死亡數		23
ICD-10對死因統計之影響		32
結論		33
參考資料		34

ICD-10 台中市 / 全國十大死亡原因

順位	死亡原因	台中市				順位	死亡原因	全國			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	標準化死亡率			死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	標準化死亡率
	所有死亡原因	5,145	480.9	100.0	441.3		所有死亡原因	142,240	616.3	100.0	466.7
1	惡性腫瘤	1,613	150.8	31.4	137.5	1	惡性腫瘤	39,917	173.0	28.1	132.5
2	心臟性疾病 (高血壓性疾病除外)	468	43.7	9.1	39.3	2	心臟性疾病 (高血壓性疾病除外)	15,093	65.4	10.6	47.7
3	腦血管疾病	311	29.1	6.0	26.7	3	腦血管疾病	10,383	45.0	7.3	32.8
4	糖尿病	304	28.4	5.9	26.6	4	肺炎	8,358	36.2	5.9	25.3
5	事故傷害	248	23.2	4.8	22.2	5	糖尿病	8,229	35.7	5.8	26.6
6	肺炎	237	22.2	4.6	19.9	6	事故傷害	7,358	31.9	5.2	27.7
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	179	16.7	3.5	15.6	7	慢性下呼吸道疾病	4,955	21.5	3.5	14.9
8	蓄意自我傷害(自殺)	169	15.8	3.3	13.7	8	慢性肝病及肝硬化 蓄意自我傷害(自殺)	4,918	21.3	3.5	16.6
9	高血壓性疾病	167	15.6	3.2	14.3	9	蓄意自我傷害(自殺)	4,063	17.6	2.9	14.7
10	慢性肝病及肝硬化	167	15.6	3.2	13.9	10	腎炎腎徵候群 及腎性病變	3,999	17.3	2.8	12.5

附註：1. 台中市98年年中人口數計 1,069,882人，男性 521,475人，女性 548,407人。

2. 全國98年年中人口數計 23,078,402人，男性 11,631,542人，女性 11,446,859人。

3. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市男性 / 女性十大死亡原因

順位	死亡原因	男				順位	死亡原因	女			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	標準死亡率			死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	標準死亡率
	所有死亡原因	3,114	597.2	100.0	547.2		所有死亡原因	2,031	370.3	100.0	346.2
1	惡性腫瘤	986	189.1	31.7	175.4	1	惡性腫瘤	627	114.3	30.9	102.8
2	心臟性疾病(高血壓性疾病除外)	276	52.9	8.9	47.1	2	心臟性疾病(高血壓性疾病除外)	192	35.0	9.5	32.4
3	腦血管疾病	187	35.9	6.0	33.3	3	糖尿病	148	27.0	7.3	25.4
4	事故傷害	182	34.9	5.8	32.8	4	腦血管疾病	124	22.6	6.1	20.8
5	糖尿病	156	29.9	5.0	28.2	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	99	18.1	4.9	17.1
6	肺炎	154	29.5	4.9	26.5	6	肺炎	83	15.1	4.1	14.1
7	慢性肝病及肝硬化	115	22.1	3.7	19.9	7	高血壓性疾病	68	12.4	3.3	11.9
8	慢性下呼吸道疾病	108	20.7	3.5	18.0	8	蓄意自我傷害(自殺)	67	12.2	3.3	10.3
9	蓄意自我傷害(自殺)	102	19.6	3.3	17.4	9	事故傷害	66	12.0	3.2	12.1
10	高血壓性疾病	99	19.0	3.2	16.9	10	敗血症	62	11.3	3.1	10.7

附註：1. 98年年中人口數合計1,069,882人，男性521,475人，女性548,407人。

2. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

台中市各區死亡人數按死亡年齡區分

計數的鄉鎮	年 齡																			
鄉鎮	0歲	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	總計
中區				1	1		4	1	3	3	5	7	19	10	9	11	21	27	29	151
東區	4		1		2	5	3	7	10	9	23	35	39	23	50	46	63	80	102	502
西區	2			1	5	7	3	3	9	18	31	31	45	32	50	70	92	84	125	608
南區	8	2	1	2	6	5	8	7	12	22	19	40	40	44	38	53	69	72	87	535
北區	2	2	2		1	7	5	8	20	21	39	50	55	40	71	68	108	152	180	831
西屯區	3	3	1	2	6	3	8	14	20	32	46	59	57	55	59	89	99	145	132	833
南屯區	9		4	3	3	4	7	6	17	24	22	34	30	34	41	64	70	72	91	535
北屯區	11	2		2	2	8	17	23	24	45	50	73	97	84	91	98	128	186	209	1150
總計	39	9	9	11	26	39	55	69	115	174	235	329	382	322	409	499	650	818	955	5145

台中市十大死因年齡結構別死亡概況

年齡別	A00-Y98	C00-C97	I01-I02.0、I05-109、120-125、127、130-152	I60-I69	E10-E14	V01-X59、Y85-Y86	J12-J18	N00-N07、N17-N19、N25-N27	X60-X84、Y87.0	I10-I15	K70、K73-K74	其他
	所有死因	惡性腫瘤	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	腦血管 疾病	糖尿病	意外事故	肺炎	腎炎、腎病 症候群 及腎病變	蓄意自我傷 害(自殺)	高血壓疾 病	慢性肝病 及肝硬化	
總計	5,145	1,613	468	311	304	248	237	179	169	167	167	1,282
0	39	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	33
1-4	9	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	3
5-9	9	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6
10-14	11	2	1	-	-	7	-	-	-	-	-	1
15-19	26	4	-	-	-	10	-	1	4	-	-	7
20-24	39	9	-	-	-	15	-	-	5	-	-	10
25-29	55	3	-	1	-	20	-	-	13	-	1	17
30-34	69	17	4	3	2	15	-	-	15	-	1	12
35-39	115	32	7	5	3	13	1	1	23	1	10	19
40-44	174	61	8	5	2	17	2	5	21	1	13	39
45-49	235	108	9	4	2	22	4	2	21	3	20	40
50-54	329	154	22	12	18	12	8	5	18	7	20	53
55-59	382	176	42	10	19	18	2	10	18	5	23	59
60-64	322	135	23	13	21	13	10	10	6	12	15	64
65-69	409	170	35	25	31	8	12	14	7	18	15	74
70-74	499	161	33	45	47	18	24	29	8	15	19	100
75-79	650	219	71	47	42	18	33	30	7	22	13	148
80-84	818	207	83	62	57	14	56	34	3	35	9	258
85+	955	152	129	79	59	20	84	37	-	48	8	339

台中市各區死亡人數按性別區分

計數的鄉鎮	性別		
	男性	女性	總計
鄉鎮			
中區	96	55	151
東區	300	202	502
西區	362	246	608
南區	315	220	535
北區	527	304	831
西屯區	510	323	833
南屯區	315	220	535
北屯區	689	461	1,150
總計	3,114	2,031	5,145

台中市各區死亡人數死亡種類別

計數的鄉鎮	死亡種類					
鄉鎮	病死或自然死	意外死	自殺	他殺	不詳	總計
中區	135	6	4	2	4	151
東區	471	12	14		5	502
西區	565	21	11	2	9	608
南區	482	32	19		2	535
北區	755	34	38	1	3	831
西屯區	745	49	20	1	18	833
南屯區	482	23	23	1	6	535
北屯區	1,043	53	40	1	13	1,150
總計	4,678	230	169	8	60	5,145

ICD-10 台中市中區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率			死亡百分比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	151	96	55	644.9	831.1	463.6	478.2	630.6	328.2	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	42	28	14	179.4	242.4	118.0	140.7	185.1	96.5	27.8	29.2	14.6
2	I01-I02.0、I05-I09、 I20-I25、I27、I30-I52	心臟性疾病(高血壓性疾病除外)	12	7	5	51.2	60.6	42.1	35.6	43.4	26.4	7.9	7.3	5.2
3	E10-E14	糖尿病	10	5	5	42.7	43.3	42.1	29.9	31.4	29.3	6.6	5.2	5.2
4	J12-J18	肺炎	9	4	5	38.4	34.6	42.1	24.4	24.9	23.6	6.0	4.2	5.2
5	A40-A41	敗血症	8	5	3	34.2	43.3	25.3	21.7	28.9	14.0	5.3	5.2	3.1
6	I60-I69	腦血管疾病	8	6	2	34.2	51.9	16.9	22.9	37.3	9.6	5.3	6.3	2.1
7	V01-X59、Y85-Y86	事故傷害	6	5	1	25.6	43.3	8.4	25.5	48.0	-	4.0	5.2	1.0
8	I10-I15	高血壓性疾病	5	3	2	21.4	26.0	16.9	15.7	17.8	13.9	3.3	3.1	2.1
9	N00-N07、N17-N19、 N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	3	2	21.4	26.0	16.9	13.6	17.8	10.9	3.3	3.1	2.1
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	1	3	17.1	8.7	25.3	14.9	-	20.8	2.6	1	3.1

附註: 1. 98年台中市中區年中人口數計 23,416 人，男性 11,551，女性 11,864。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市東區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率			死亡百分比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	502	300	202	678.5	800.1	553.6	488.2	584.9	396.4	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	155	100	55	209.5	266.7	150.7	154.4	194.5	112.9	30.9	33.3	27.2
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27,	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	49	25	24	66.2	66.7	65.8	48.3	47.1	50.5	9.8	8.3	11.9
3	J12-J18	肺炎	35	21	14	47.3	38.4	38.4	29.4	35.8	24.1	7.0	7.0	6.9
4	E10-E14	糖尿病	33	23	10	44.6	61.3	27.4	31.5	43.6	19.8	6.6	7.7	5.0
5	I60-I69	腦血管疾病	30	20	10	40.6	27.4	27.4	28.2	39.7	17.9	6.0	6.7	5.0
6	I10-I15	高血壓性疾病	24	9	15	32.4	24.0	41.1	22.0	16.8	28.1	4.8	3.0	7.4
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	5	13	24.3	13.3	35.6	16.9	13.3	24.1	3.6	1.7	6.4
8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	14	10	4	18.9	26.7	11.0	15.0	23.0	-	2.8	3.3	2.0
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	14	7	7	18.9	18.7	19.2	15.3	15.3	15.0	2.8	2.3	3.5
10	A40-A41	敗血症	13	7	6	17.6	18.7	16.4	11.1	-	10.9	2.6	2.3	3.0

附註: 1. 98年台中市東區年中人口數計 73,982 人，男性 37,496，女性 36,486。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市西區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率死亡百分比					
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	608	362	246	518.1	640.2	404.5	410.1	542.3	318.0	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	191	111	80	162.7	196.3	131.5	134.1	166.6	103.8	31.4	30.7	32.5
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	65	41	24	55.4	72.5	39.5	30.0	58.9	29.7	10.7	11.3	9.8
3	E10-E14	糖尿病	36	21	15	30.7	37.1	24.7	24.4	32.6	19.6	5.9	5.8	6.1
4	I60-I69	腦血管疾病	34	23	11	29.0	40.7	18.1	24.9	34.5	13.4	5.6	6.4	4.5
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	24	14	10	20.5	24.8	16.4	19.9	22.2	13.9	3.9	3.9	4.1
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	21	7	14	17.9	12.4	23.0	16.1	14.8	18.9	3.5	1.9	5.7
7	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	20	12	8	17.0	21.2	13.2	13.7	17.2	10.1	3.3	3.3	3.3
8	J12-J18	肺炎	19	11	8	16.2	19.5	13.2	14.9	15.7	10.4	3.1	3.0	3.3
9	I10-I15	高血壓性疾病	19	13	6	16.2	23.0	9.9	14.9	19.0	0.0	3.1	3.6	2.4
10	A40-A41	敗血症	18	11	7	15.3	19.5	11.5	11.9	15.5	9.8	3.0	3.0	2.8

附註: 1. 98年台中市西區年中人口數計 117,358 人，男性 56,542，女性 60,815。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市南區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率			死亡百分比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	535	315	220	476.4	576.3	381.7	471.0	581.4	372.3	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	160	96	64	142.5	175.6	111.0	138.5	180.6	101.8	29.9	30.5	29.1
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	40	25	15	35.6	45.7	26.0	33.0	43.1	24.1	7.5	7.9	6.8
3	E10-E14	糖尿病	36	22	14	32.1	40.2	24.3	31.3	39.4	23.4	6.7	7.0	6.4
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	33	26	7	29.4	47.6	12.1	29.1	47.7	11.1	6.2	8.3	3.2
5	I60-I69	腦血管疾病	26	12	14	23.2	22.0	24.3	23.2	22.6	23.0	4.9	3.8	6.4
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	22	11	11	19.6	20.1	19.1	17.4	16.7	18.0	4.1	3.5	5.0
7	J12-J18	肺炎	22	12	10	19.6	22.0	17.3	19.5	22.6	16.6	4.1	3.8	4.5
8	I10-I15	高血壓性疾病	21	9	12	18.7	16.5	20.8	18.8	0.0	21.1	3.9	2.9	5.5
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	20	10	10	17.8	18.3	17.3	17.9	19.4	16.4	3.7	3.2	4.5
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	19	14	5	16.9	25.6	8.7	14.5	22.2	-	3.6	4.4	2.3

附註：1. 98年台中市南區年中人口數 計 112,300 人，男性 54,663，女性 57,637。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市北區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率			死亡百分比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	831	527	304	562.9	734.0	400.9	423.7	568.9	291.8	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	259	164	95	175.4	228.4	125.3	136.0	185.9	91.9	31.2	31.1	31.3
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	83	53	30	56.2	73.8	39.6	40.9	55.2	28.1	10.0	10.1	9.9
3	I60-I69	腦血管疾病	41	27	14	27.8	37.6	18.5	20.4	28.4	13.1	4.9	5.1	4.6
4	E10-E14	糖尿病	40	15	25	27.1	20.9	33.0	19.8	15.7	23.6	4.8	2.8	8.2
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	39	31	8	26.4	43.2	10.5	24.8	39.9	10.5	4.7	5.9	2.6
6	60-X84, Y87.	蓄意自我傷害 (自殺)	38	25	13	25.7	34.8	17.1	20.6	29.0	12.9	4.6	4.7	4.3
7	J12-J18	肺炎	37	31	6	25.1	43.2	7.9	17.8	31.2	-	4.5	5.9	2.0
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎	29	15	14	19.6	20.9	18.5	14.5	15.4	13.6	3.5	2.8	4.6
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	28	20	8	19.0	27.9	10.5	14.8	22.3	8.2	3.4	3.8	2.6
10	A40-A41	敗血症	24	6	12	16.3	16.7	15.8	11.9	-	11.9	2.9	1.1	3.9

附註: 1. 98年台中市北區年中人口數計 147,625 人，男性 71,795，女性 75,830。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市西屯區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率			死亡百分比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	833	510	323	411.3	516.7	311.1	416.4	505.1	338.2	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	261	156	105	128.9	158.1	101.1	129.3	156.5	103.7	31.3	30.6	32.5
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	69	43	26	34.1	43.6	25.0	34.3	41.7	28.5	8.3	8.4	8.0
3	E10-E14	糖尿病	64	34	30	31.6	34.4	28.9	34.7	38.1	32.8	7.7	6.7	9.3
4	I-X59, Y85-Y	事故傷害	52	34	13	25.7	39.5	12.5	25.6	37.8	14.1	6.2	6.7	4.0
5	I60-I69	腦血管疾病	51	31	20	25.2	31.4	19.3	26.1	31.6	20.8	6.1	6.1	6.2
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	31	16	11	15.3	20.3	10.6	14.2	18.8	10.5	3.7	3.1	3.4
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	31	23	8	15.3	23.3	7.7	16.3	23.8	-	3.7	4.5	2.5
8	I10-I15	高血壓性疾病	28	17	11	13.8	17.2	10.6	14.2	14.9	12.6	3.4	3.3	3.4
9	J12-J18	肺炎	28	16	12	13.8	16.2	11.6	13.9	16.4	13.0	3.4	3	3.7
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	27	14	13	13.3	14.2	12.5	13.3	11.9	14.8	3.2	2.7	4.0

附註：1. 98年台中市西屯區年中人口數計 202,506 人，男性 98,695，女性 103,812。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市南屯區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率死亡百分比					
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	535	315	220	357.8	435.8	284.7	433.9	520.2	357.7	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	176	109	67	117.7	150.8	86.7	137.0	175.1	100.4	32.9	34.6	30.5
2	I05-I09, I20-I25, I27, I30-	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	46	22	24	30.8	30.4	31.1	37.7	35.6	39.9	8.6	7.0	10.9
3	I60-I69	腦血管疾病	45	23	22	30.1	31.8	28.5	39.3	41.3	37.9	8.4	7.3	10.0
4	E10-E14	糖尿病	29	12	17	19.4	16.6	22.0	24.6	20.1	29.4	5.4	3.8	7.7
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	25	19	6	16.7	26.3	7.8	19.3	28.5	10.1	4.7	6.0	2.7
6	J12-J18	肺炎	25	14	11	16.7	19.4	14.2	21.6	24.5	19.6	4.7	4.4	5.0
7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	23	16	7	15.4	22.1	9.1	14.4	22.5	7.0	4.3	5.1	3.2
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	16	7	9	10.7	9.7	11.6	13.1	-	15.0	3.0	2	4
9	I10-I15	高血壓性疾病	15	12	3	10.0	16.6	4.0	13.0	22.0	-	2.8	3.8	1
10	A40-A41	敗血症	14	8	6	9.4	11.1	7.8	11.9	-	9.9	2.6	3	2.7

附註: 1. 98年台中市南屯區年中人口數計 149,545 人，男性 72,282，女性 77,262。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市北屯區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率			死亡百分比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	1150	689	461	473.0	581.7	369.7	455.9	549.5	375.4	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	369	222	147	151.8	187.4	117.9	143.9	178.8	112.0	32.1	32.2	31.9
2	I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	104	60	44	42.8	50.7	35.3	40.9	47.3	36.0	9.0	8.7	9.5
3	I60-I69	腦血管疾病	76	45	31	31.3	38.0	24.9	30.5	36.5	26.2	6.6	6.5	6.7
4	J12-J18	肺炎	62	45	17	25.5	38.0	13.6	24.8	35.2	14.7	5.4	6.5	3.7
5	E10-E14	糖尿病	56	24	32	23.0	20.3	25.7	22.2	19.6	25.8	4.9	3.5	6.9
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	56	38	18	23.0	32.1	14.4	21.6	28.6	15.1	4.9	5.5	3.9
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	43	19	24	17.7	16.0	19.2	18.2	-	20.4	3.7	2.8	5.2
8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	40	26	14	16.5	24.5	11.2	14.5	19.7	10.2	3.5	3.8	3.0
9	A40-A41	敗血症	37	18	19	15.2	15.2	15.2	14.7	-	15.9	3.2	2.6	4.1
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	35	29	6	14.4	24.5	4.8	13.5	23.3	-	3.0	4.2	1.3

附註：1. 98年台中市北屯區年中人口數計243,150人，男性118,450，女性124,700。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市 / 全國主要癌症死亡原因

順位	死亡原因	台中市				順位	死亡原因	全國			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	標準死亡率			死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	標準死亡率
	所有癌症死亡原因	1,613	150.8	100.0	137.5		所有癌症死亡原因	39,917	173.0	100.0	132.5
1	氣管、支氣管和肺癌	288	26.9	17.9	24.9	1	氣管、支氣管和肺癌	7,951	34.5	19.9	25.9
2	肝和肝內膽管癌	270	25.2	16.7	23.7	2	肝和肝內膽管癌	7,759	33.6	19.4	26.2
3	女性乳房癌	93	17.0(1)	5.8	14.3	3	結腸、直腸和肛門癌	4,531	19.6	11.4	14.8
4	結腸、直腸和肛門癌	181	16.9	11.2	15.4	4	女性乳房癌	1,588	13.9(1)	8.0	10.6
5	胃癌	106	9.9	6.6	8.9	5	胃癌	2,282	9.9	5.7	7.3
6	口腔癌	89	8.3	5.5	7.4	6	口腔癌	2,249	9.7	5.6	7.6
7	胰臟癌	69	6.4	4.3	5.9	7	前列腺(攝護腺)癌	936	8.0(2)	4.6	5.9
8	食道癌	67	6.3	4.2	5.4	8	食道癌	1,489	6.5	3.7	5.0
9	前列腺(攝護腺)癌	32	6.1(2)	2.0	5.6	9	胰臟癌	1,480	6.4	3.7	4.9
10	子宮頸及 部位未明示子宮癌	28	5.1(1)	1.7	4.4	10	子宮頸及 部位未明示子宮癌	657	5.7(1)	3.3	4.2

附註：1. 台中市98年年中人口數 計1,069,882人，男性521,475人，女性548,407人。

2. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市男性 / 女性主要癌症死亡原因


順位	死原	亡因	男				順位	死原	亡因	女			
			死亡人數	每十萬人口死亡 率	死亡百分比	標準化死亡 率				死亡人數	每十萬人口死亡 率	死亡百分比	標準化死亡 率
	所有癌症死亡原因				986	189.1	100.0	175.4		所有癌症死亡原因			
1	氣管、支氣管和肺癌				197	37.8	20.0	34.8	1	女性乳房癌			
2	肝和肝內膽管癌				184	35.3	18.7	33.7	2	氣管、支氣管和肺癌			
3	結腸、直腸和肛門癌				98	18.8	9.9	17.5	3	肝和肝內膽管癌			
4	口腔癌				84	16.1	8.5	14.9	4	結腸、直腸和肛門癌			
5	食道癌				64	12.3	6.5	10.9	5	胃癌			
6	胃癌				59	11.3	6.0	10.2	6	子宮頸及 部位未明示子宮癌			
7	胰臟癌				43	8.2	4.4	7.5	7	胰臟癌			
8	非何杰金氏淋巴瘤				34	6.5	3.4	6.3	8	卵巢癌			
9	前列腺(攝護腺)癌				32	6.1	3.2	5.6	9	白血症			
10	鼻咽癌				31	5.9	3.1	5.6	10	腦癌			

附註：1. 台中市98年年中人口數 計1,069,882人，男性521,475人，女性548,407人。

2. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

女性癌症主要死因	98年標準化	97年標準化	男性癌症主要死因	98年標準化	97年標準化
氣管、支氣管和肺癌	15.3	17.3	氣管、支氣管和肺癌	34.8	40.2
女性乳癌	14.3	13.9	肝和肝內膽管癌	33.7	37.3
結腸、直腸和肛門癌	13.5	14.3	結腸、直腸和肛門癌	17.5	16.6
肝和肝內膽管癌	15.0	13.4	口腔癌	14.9	13.9
子宮頸及 部位未明示子宮癌	4.4	5.8	食道癌	14.9	9.1
胃癌	7.7	5.6	胃癌	10.2	7.6
胰臟癌	4.4	4.9	前列腺(攝護腺)癌	5.6	6.9
卵巢癌	3.4	2.8	胰臟癌	7.5	6.9
非何杰金氏淋巴瘤	2.2	2.6	非何杰金氏淋巴瘤	6.3	5.2
腦癌	2.2	2.1	鼻咽癌	5.6	3.6


台中市男性98年與97年主要癌症死亡率



附註：1、97(含)年以後死因統計採ICD-10版分類，與96(含)年以前採用之ICD-9版略有不同。

台中市女性98年與97年主要癌症死亡率

每十萬人
口死亡率



附註：1、97(含)年以後死因統計採ICD-10版分類，與96(含)年以前採用之ICD-9版略有不同。

个回。

ICD-10 台中市各年齡別意外事故及自殺死亡數

年齡別	年度總死亡數	意外事故															蓄意自我傷害(自殺)		
		V01-X59 、 Y85-Y86		運輸意外事故				意外中毒 X40-X49		意外墜落 W00-W19		火及火焰所致 之意外事故 X00-X09		意外之淹死及 溺水 W65- W74		其他		死亡人數	佔當年總死亡數(%)
		死亡人數	佔當年總死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)				
嬰兒(0歲)	39	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
兒童(1-4歲)	9	3	33	1	33	1	33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	67	-	-
少年(5-14歲)	20	8	40	5	63	5	63	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
青年(15-24歲)	65	25	38	22	88	22	88	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4	9	14
壯年(25-44歲)	413	65	16	31	48	31	48	17	-	7	-	1	-	-	-	9	14	72	17
中年(45-64歲)	1,268	65	5	32	49	29	45	4	-	15	-	1	-	5	-	8	12	63	5
老年(65歲以上)	3,331	78	2	32	41	31	40	2	3	19	24	1	-	3	4	21	27	25	1
合計	5,145	248	5	123	50	119	48	23	9	44	18	3	1	10	4	45	18	169	3

ICD-10 台中市中區各年齡別意外事故及自殺死亡數

年齡別	年度總死亡數	事故傷害															蓄意自我傷害(自殺)	
		V01-X59、Y85-Y86		運輸事故		意外中毒 X40-X49		意外墜落 W00-W19		火及火焰所致之意外事故 X00-X09		意外之淹死及溺水 W65-W74		其他 X10-X19		X60-X84		
				機動車交通事故 V02-V049、V090、V092、V12-V149、V190-V192、V194-V196、V20-V799、V803-V805、V810-V811、V820-V821、V83-V869、V870-B878、V880-V888、V890、V892														
		死亡人數	佔當年總死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數
嬰兒(0歲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兒童(1-4歲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
少年(5-14歲)	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青年(15-24歲)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壯年(25-44歲)	11	4	36	3	75	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	18
中年(45-64歲)	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
老年(65歲以上)	97	1	1	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	151	6	4	5	83	5	83	-	-	1	17	-	-	-	-	-	4	3

ICD-10 台中市東區各年齡別意外事故及自殺死亡數

年齡別	年度總死亡數	事故															蓄意自我傷害(自殺)			
		V01-X59 、 Y85-Y86		運輸事故					意外中毒 X40-X49		意外墜落 W00-W19		火及火焰所致之意外事故 X00-X09		意外之淹死及溺水 W65-W74		其他 X10-X19		X60-X84	
				機動車交通事故 V02-V049、V090、 V092、V12-V149、 V190-V192、V194- V196、V20-V799、 V803-V805、V810- V811、V820-V821、 V83-V869、V870- B878、V880-V888、 V890、V892																
				死亡人數	佔當年總死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數												
嬰兒(0歲)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
兒童(1-4歲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
少年(5-14歲)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青年(15-24歲)	7	1	14	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	
壯年(25-44歲)	29	5	17	3	60	3	60	2	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	
中年(45-64歲)	120	2	2	1	50	1	50	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	
老年(65歲以上)	341	5	1	4	80	4	80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	
合計	502	13	3	9	69	9	69	3	23	-	-	-	-	-	-	1	-	14	3	

ICD-10 台中市西區各年齡別意外事故及自殺死亡數

年齡別	年度總死亡數	事故傷害															蓄意自我傷害(自殺)			
		V01-X59 、 Y85-Y86		運輸事故					意外中毒 X40-X49		意外墜落 W00-W19		火及火焰所致之意外事故 X00-X09		意外之淹死及溺水 W65-W74		其他 X10-X19		X60-X84	
				機動車交通事故 V02-V049、V090、 V092、V12-V149、 V190-V192、V194- V196、V20-V799、 V803-V805、V810- V811、V820-V821、 V83-V869、V870- B878、V880-V888、 V890、V892																
				死亡人數	佔當年總死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數												
嬰兒(0歲)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
兒童(1-4歲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
少年(5-14歲)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青年(15-24歲)	12	4	33	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	
壯年(25-44歲)	33	3	9	1	33	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	5	15	
中年(45-64歲)	139	5	4	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	3	2	
老年(65歲以上)	421	11	3	6	55	6	55	-	1	9	-	-	1	9	3	-	-	1	-	
合計	608	24	4	12	50	12	50	-	5	21	1	4	2	8	4	-	-	11	2	

ICD-10 台中市南區各年齡別意外事故及自殺死亡數

年齡別	年度總死亡數	事故傷害															蓄意自我傷害(自殺)				
		V01-X59、Y85-Y86		運輸事故 V01-V99					意外中毒 X40-X49		意外墜落 W00-W19		火及火焰所致之意外事故 X00-X09		意外之淹死及溺水 W65-W74		其他 X10-X19		X60-X84		
		死亡人數	佔當年總死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	機動車交通事故 V02-V049、V090、V092、V12-V149、V190-V192、V194-V196、V20-V799、V803-V805、V810-V811、V820-V821、V83-V869、V870-B878、V880-V888、V890、V892		死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年總死亡數(%)
						死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)														
嬰兒(0歲)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兒童(1-4歲)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
少年(5-14歲)	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青年(15-24歲)	11	6	55	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	18		
壯年(25-44歲)	49	11	22	5	45	5	-	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	7	14		
中年(45-64歲)	143	9	6	3	-	3	-	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	8	6		
老年(65歲以上)	319	6	2	1	17	1	17	1	17	3	50	-	-	-	-	1	-	2	1		
合計	535	33	6	15	45	15	45	5	15	8	24	-	-	-	-	5	-	19	4		

ICD-10 台中市北區各年齡別意外事故及自殺死亡數

年齡別	年度總死亡數	事故傷害															蓄意自我傷害(自殺)				
		V01-X59、Y85-Y86		運輸事故 V01-V99					意外中毒 X40-X49		意外墜落 W00-W19		火及火焰所致之意外事故 X00-X09		意外之淹死及溺水 W65-W74		其他 X10-X19		X60-X84		
		死亡人數	佔當年總死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	機動車交通事故 V02-V049、V090、V092、V12-V149、V190-V192、V194-V196、V20-V799、V803-V805、V810-V811、V820-V821、V83-V869、V870-B878、V880-V888、V890、V892		死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年總死亡數(%)
						死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)														
嬰兒(0歲)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
兒童(1-4歲)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
少年(5-14歲)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青年(15-24歲)	8	3	38	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
壯年(25-44歲)	54	8	15	2	25	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	16	30		
中年(45-64歲)	184	10	5	6	-	5	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	15	8		
老年(65歲以上)	579	15	3	4	27	4	27	-	-	3	20	-	-	1	7	7	-	7	1		
合計	831	39	5	15	38	14	36	3	8	7	18	-	-	2	5	12	-	38	5		

ICD-10 台中市西屯區各年齡別意外事故及自殺死亡數

年齡別	年度總死亡數	事故傷害															蓄意自我傷害(自殺)			
		V01-X59 、 Y85-Y86		運輸事故					意外中毒 X40-X49		意外墜落 W00-W19		火及火焰所致之意外事故 X00-X09		意外之淹死及溺水 W65-W74		其他 X10-X19		X60-X84	
				機動車交通事故 V02-V049、V090、 V092、V12-V149、 V190-V192、V194- V196、V20-V799、 V803-V805、V810- V811、V820-V821、 V83-V869、V870- B878、V880-V888、 V890、V892																
				死亡人數	佔當年總死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數												
嬰兒(0歲)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
兒童(1-4歲)	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
少年(5-14歲)	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青年(15-24歲)	9	4	44	3	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	
壯年(25-44歲)	74	15	20	9	60	9	-	1	-	1	-	1	-	-	3	-	7	9		
中年(45-64歲)	217	11	5	5	-	4	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	9	4		
老年(65歲以上)	524	19	4	9	47	9	47	-	-	3	16	1	-	-	6	-	3	1		
合計	833	52	6	28	54	27	52	1	2	7	13	2	4	2	4	12	-	20	2	

ICD-10 台中市南屯區各年齡別意外事故及自殺死亡數

年齡別	年度總死亡數	事故傷害															蓄意自我傷害(自殺)		
		V01-X59 、 Y85-Y86		運輸事故				意外中毒 X40-X49		意外墜落 W00-W19		火及火焰所致之意外事故 X00-X09		意外之淹死及溺水 W65-W74		其他 X10-X19		X60-X84	
				機動車交通事故 V02-V049、V090、 V092、V12-V149、 V190-V192、V194- V196、V20-V799、 V803-V805、V810- V811、V820-V821、 V83-V869、V870- B878、V880-V888、 V890、V892															
死亡人數	佔當年總死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年總死亡數(%)		
嬰兒(0歲)	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
兒童(1-4歲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
少年(5-14歲)	7	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
青年(15-24歲)	7	2	29	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	43
壯年(25-44歲)	54	7	13	4	57	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	19
中年(45-64歲)	120	5	4	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	7	6
老年(65歲以上)	338	8	2	4	50	4	50	-	-	2	25	-	-	-	-	2	-	3	1
合計	535	25	5	12	48	12	48	2	8	5	20	-	-	1	4	5	-	23	4

ICD-10 台中市北屯區各年齡別意外事故及自殺死亡數

年齡別	年度總死亡數	事故傷害															蓄意自我傷害(自殺)		
		V01-X59 、 Y85-Y86		運輸事故				意外中毒 X40-X49		意外墜落 W00-W19		火及火焰所致之意外事故 X00-X09		意外之淹死及溺水 W65-W74		其他 X10-X19		X60-X84、 Y87.0	
				機動車交通事故 V02-V049、V090、 V092、V12-V149、 V190-V192、V194- V196、V20-V799、 V803-V805、V810- V811、V820-V821、 V83-V869、V870- B878、V880-V888、 V890、V892															
死亡人數	佔當年總死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年意外事故死亡數(%)	死亡人數	佔當年總死亡數(%)		
嬰兒(0歲)	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
兒童(1-4歲)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
少年(5-14歲)	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
青年(15-24歲)	10	5	50	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
壯年(25-44歲)	109	12	11	4	33	4	-	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	23	21
中年(45-64歲)	304	23	8	14	-	13	-	2	-	3	-	-	-	1	-	3	-	11	4
老年(65歲以上)	712	13	2	3	23	2	15	1	8	7	54	-	-	1	8	1	-	6	1
合計	1150	56	5	27	48	25	45	9	16	11	20	-	-	3	5	6	-	40	3

ICD-10對死因統計之影響：

衛生署自97年起死因統計正式採用ICD-10版分類，ICD-10除了刪除合併或新增一些分類項外，對於原死因選擇規則亦有若干重大改變，因此分別以ICD-10或ICD-9分類統計時，兩者死因順位與內容不盡相同。

造成兩版差異的主因係ICD-10死因統計作業採ACME電腦軟體選擇原死因，比較重視填在每一行第一個死因診斷，較少考慮填在同一行右邊第二個或第三個診斷。因此敗血症、心臟衰竭等不明示的死亡轉機常被選擇。而ICD-9則是由衛生署統計室三科編碼員以人工方式選擇原死因，傳統上較不接受以死亡轉機作為原死因，如果死亡證明書填在同一行右邊第二或第三診斷或者是第二部分有較明確的死因診斷，編碼員大多會放棄死亡轉機，而改選擇明確診斷為原死因。

大體而言，以ICD-10選擇原死因時，惡性腫瘤、腦血管疾病、糖尿病、腎病變的死亡數都低於以ICD-9選擇原死因的死亡數。反之，以ICD-10選擇原死因，敗血症、心臟疾病與肺炎的死亡數會高於以ICD-9選擇原死因的死亡數。

結論：

台中市98年度死亡總人數5,145人，其中男性3,114人、女性2,031人，男性較女性死亡人數多出1,083人；死亡年齡以80~84歲之年齡層818人最多，75~79歲之年齡層650人居次，以上二個年齡層合計共1,468人佔死亡人數的28.53%。按年齡層區分死亡人數中0~59歲占29%；60~79歲占36.54%；80歲以上(含80歲)占34.46%，顯示市民之平均壽命延長致人口年齡結構老化。依據內政部估計國人98年零歲平均餘命，男性為75.88歲、女性為82.46歲，分別較97年增加0.29歲與0.52歲。

台中市與全國十大死因中均以惡性腫瘤高居首位、心臟性疾病次之、腦血管疾病為第三位。近年來惡性腫瘤死亡率年年高居第一位，98年台中市男性癌症內容及順位大致與97年相同。而女性癌症之氣管、支氣管和肺癌由第一順位下降為第二順位，女性乳癌則由第二順位竄升為第一順位。

本文僅就台中市98年度死因予以統計分析，盼能提供主管機關及有關單位作為決策之參考。

參考資料：

一、行政院衛生署十大死因統計資料

二、內政部國人平均壽命統計資料

三、行政院衛生署統計室陳麗華專門委員著「ICD-10改版對縣市死因排序之影響」

四、國立成功大學公共衛生研究所呂宗學教授著「台灣ICD-10改版過程介紹及對十大死因排序之影響」