

國小新生入學後預防接種紀錄檢查與補種指引

107 年 7 月修訂

疫苗別	學前應完成劑數	新生查卡注意事項	補種建議		
卡介苗 (BCG)	1		無接種紀錄者安排補種		
			完成 ² 劑次	補種 劑次	補種時程 ¹
B 型肝炎疫苗 (HepB)	3	接種六合一疫苗之劑次列入計算	0 1 2	3 2 1	0 → 1m → 6m 0 → 5m
小兒麻痺疫苗 (OPV/IPV)	4	1. 接種五合一或六合一疫苗之劑次列入計算 2. DTP/DTaP/Tdap 相關疫苗第 4 劑在 4 歲以後才完成接種，則滿 5 歲應接種之 DTaP-IPV 疫苗可不再接種。	0	4	DTaP-IPV ⇔ IPV ³ ⇔ IPV ↗ IPV
			最近 1 劑 < 4 歲		
			1 2 3	3 2 1	DTaP-IPV ⇔ IPV ³ ↗ IPV DTaP-IPV ↗ IPV DTaP-IPV
			最近 1 劑 ≥ 4 歲		
			1 2、3	2 1	DTaP-IPV ↗ IPV DTaP-IPV
			0	3	DTaP-IPV ⇔ DTaP-IPV ↗ Td
			最近 1 劑 < 4 歲		
			1 2 3	3 2 1	DTaP-IPV ⇔ DTaP-IPV ↗ Td DTaP-IPV ↗ Td DTaP-IPV
			最近 1 劑 ≥ 4 歲		
			1 2、3	2 1	DTaP-IPV ↗ Td DTaP-IPV
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR)	2		0 1	2 1	MMR ↗ MMR MMR
水痘疫苗 (Varicella)	1	已自然感染過水痘經醫師確診者無須再接補種	0	1	Varicella
日本腦炎疫苗 (JE) ⁴	2	已接種不活化日本腦炎疫苗者，依建議接續接種活性減毒疫苗	0 1 2 3	2 2 1 1	JE → JE → JE → JE → JE → JE
		已接種活性減毒疫苗者	1	1	→ JE
	4	經評估不適合接種活性減毒日本腦炎疫苗者 ⁵	0 1 2 3	3 3 2 1	JE ↗ JE → JE JE ↗ JE → JE → JE → JE → JE
		白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 (DTaP-IPV)	1	使用於入學前滿 5 歲以上接種	0 1

備註：

- 間隔 2 週，↗ 間隔 1 個月，⇒ 間隔 2 個月，➡ 至少間隔 6 個月，→ 與前 1 劑至少間隔 12 個月
- 從未接種或忘記有無接種各項疫苗者，完成劑次視為 0。
- 如為 OPV/IPV 及 DTP/DTaP/Tdap 均未完成而需補種者，本劑應改接種 DTaP-IPV/Tdap-IPV。
- 自 106 年 5 月 22 日起改採用細胞培養之日本腦炎活性減毒疫苗，應接種 2 劑，2 劑至少間隔 12 個月。針對完成 3 劑不活化疫苗之幼童，於滿 5 歲至入國小前再接種 1 劑，與前一劑疫苗間隔至少 12 個月。
- 經醫師評估不適合接種活性減毒 JE 疫苗的孩童，衛生局/所有儲備不活化日本腦炎疫苗，可請院所協助申請。