

成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種 Q&A

115 年 8 月實施版

➤ 實施對象

Q1：有關成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種作業實施對象為何？

A：

1. 全國 65 歲以上【以 115 年為例，接種對象為 50 年次（含）以前出生】民眾。
2. 全國 55 至 64 歲【以 115 年為例，接種對象為 60 年次（含）以前出生】原住民，需檢具身分證明文件如戶口名簿或戶籍謄本。
3. 19 至 64 歲【以 115 年為例，實施對象為於民國 51 年（含）以後出生且 96 年（含）以前出生】符合侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象定義之民眾。

※IPD 高風險對象定義如下，請檢具診斷書等相關佐證資料，或經醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。

- (1) 脾臟功能缺損。
 - (2) 先天或後天免疫功能不全。
 - (3) 人工耳植入。
 - (4) 腦脊髓液滲漏。
 - (5) 一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。
4. 年齡以「接種年」減「出生年」計算。

〔註〕外籍人士需具健保身分或持有居留證。

➤ 疫苗簡介

Q2：有關成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫所提供疫苗種類為何？

A：自 115 年 8 月 10 日(含)起，公費提供 1 劑 PCV20 或 1 劑 PCV21。

如曾有肺炎鏈球菌疫苗相關接種史，接種原則請參見 Q3。

➤ 接種實務

Q3：有關成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫接種原則為何？

A：成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種原則如下：

1. 從未接種 PCV13/15/20/21 及 PPV23 者，接種 1 劑 PCV20 或 PCV21。
2. 僅接種 PPV23 且間隔至少 1 年者，接種 1 劑 PCV20 或 PCV21。
3. 僅接種 PCV13/15 且間隔至少 1 年者（IPD 高風險對象或 65 歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少 8 週），接種 1 劑 PCV20 或 PCV21。
4. 如已接種「PCV13/15 及 PPV23」或 PCV20 或 PCV21，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種 PCV20 或 PCV21*。

〔註〕*針對 19 至 64 歲 IPD 高風險對象，如於 65 歲前完整接種 PCV13/15 及 PPV23，可於滿 65 歲（含）且與前劑間隔滿（ $\geq$ ）5 年後，再追加接種 1 劑 PCV20 或 PCV21。

Q4：如 IPD 高風險對象已接種 PPV23，接續的 PCV20 或 PCV21 間隔也是至少 8 週嗎？

A：否，如 IPD 高風險對象已接種 PPV23，須間隔至少 1 年才能接種 PCV20 或 PCV21。

Q5：如不確定自己是否為 IPD 高風險對象怎麼辦？

A：可至原就醫或長期追蹤之醫療院所，由醫師藉由健保就醫資料或病歷資料及專業評估是否符合 IPD 高風險對象。

Q6：如不記得以前有無接種過肺炎鏈球菌疫苗，可否公費接種肺炎鏈球菌疫苗？

A：可至衛生所或合約醫療院所，請其協助查詢接種紀錄。若無接種紀錄，則依接種原則提供 1 劑 PCV20 或 1 劑 PCV21。

Q7：如已接種疫苗但未有接種紀錄，應如何接續接種公費疫苗？

A：建議先至原接種之醫療院所或衛生所進行補登，再依循接種建議接種。如已無法取得接種證明，經醫師依循銜接原則評估後，可提供 1 劑 PCV20 或 1 劑 PCV21。

Q8：如已自費接種 PCV13/15，可否再公費接種肺炎鏈球菌疫苗？

A：

1. 針對已自費接種者，建議先至原接種之醫療院所或衛生所進行接種紀錄補登，如僅接種過 PCV13/15 且已間隔滿 1 年（IPD 高風險對象或 65 歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少 8 週），或經查找仍無法取得接種紀錄之特例情形（視為未曾接種），可經醫師評估後，接種 1 劑公費 PCV20 或 PCV21。
2. 如有曾簽立無需接種 PCV13 聲明書紀錄者，即視為具自費接種 PCV13 之紀錄，爰依 Q10 之接種原則辦理。

Q9：如已自費接種 PPV23，可否再公費接種肺炎鏈球菌疫苗？

A：針對已自費接種者，建議先至原接種之醫療院所或衛生所進行接種紀錄補登，如僅接種過 PPV23 且已間隔滿 1 年，或經查找仍無法取得

接種紀錄之特例情形（視為未曾接種），可經醫師評估後，接種 1 劑公費 PCV20 或 PCV21。

Q10：如已自費接種 PCV13/15 及 PPV23 或已自費接種 PCV20 或 PCV21，可否再公費接種肺炎鏈球菌疫苗？

A：依接種原則，已接種「PCV13/15 及 PPV23」或「已接種 PCV20」或「已接種 PCV21」者，即已完整接種達保護效益，無需再接種 PCV20 及 PCV21，惟：

1. 若已「自費完成接種 PCV13/15 及 PPV23」或「自費接種 PCV13/15 及公費 PPV23」或「自費接種 PCV20/21」，民眾仍有公費接種 PCV20 或 PCV21 需求，與前劑間隔至少 5 年，經醫師評估可公費提供 1 劑公費 PCV20 或 PCV21。
2. 若已「自費完成接種 PPV23 及公費 PCV13」者，因已公費提供過 PCV13，故不再提供公費 PCV20 或 PCV21 接種，倘民眾仍有肺炎鏈球菌疫苗接種需求，可經醫師評估後自費接種。

Q11：PCV20 或 PCV21 可與其他疫苗同時接種嗎？

A：可以，和其他疫苗可同時接種於不同部位或間隔任何時間接種。

另秋冬常同時提供肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗及 COVID-19 疫苗，該 3 種疫苗可同時分開不同部位接種，亦或間隔任何時間接種，若同時接種 3 種疫苗，同手臂接種 2 種疫苗建議距離至少 2.5 公分。

Q12：若 PCV20 或 PCV21 與 PCV13/15 或 PPV23 接種間隔不足是否需要補種？

A：請確實依接種間隔接種，惟若發生接種間隔不足之情形，不需補種。