

DTaP-IPV 接種實務 Q&A

Q1. DTaP-IPV 之接種禁忌及注意事項為何?

A: DTaP-IPV 之接種禁忌及注意事項同 Tdap-IPV，說明如下：

接種禁忌

1. 先前接種白喉破傷風百日咳相關疫苗及小兒麻痺疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。
2. 接種含百日咳疫苗後 7 天內曾發生腦病變，且無其他可解釋病因者。

注意事項

1. 患有進行性痙攣症或神經系統疾病者，宜在醫師判斷病情已穩定後才注射疫苗。
2. 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
3. 先前接種含破傷風疫苗後 6 週內曾發生過 GBS 者。
4. 曾接種含破傷風類毒素疫苗後，發生 Arthus 過敏反應者，如果有必要追加含破傷風類毒素疫苗，應與前次接種間隔 10 年以上。
5. 不適宜接種本項疫苗之百日咳成分者，可改接種白喉破傷風混合疫苗 (DT/Td) 及不活化小兒麻痺疫苗 (IPV)。

Q2. DTaP-IPV 目前可施打於入學後的兒童嗎?

A: 目前疾病管制署提供的 DTaP-IPV 為 Sanofi Pasteur 產製(品名為 Tetraxim)，其仿單核准年齡為出生 2 個月至 7 歲，正申請變更為「適用年齡至 13 歲」，在仿單變更核准前，本項疫苗提供滿 5 歲至未滿 8 歲之兒童接種。

Q3. 兒童在國外已經打過 5 劑 DTaP，現在要打 DTaP-IPV 或 Tdap-IPV?

A: 如果兒童已經在國外依時程完成 5 劑 DTaP，或第 4 劑 DTaP 是在 4 歲後接種，就不用再打 DTaP-IPV 或 Tdap-IPV；但如果 IPV 只完成 4 劑，請在滿 5 歲入小一前再補種 1 劑 IPV。