

## 臺中市診所安全注射行為建議流程

步驟一	確實執行手部衛生。
步驟二	每次注射前取用新的注射針、針筒及注射導管(IV set 或 T 型連接管)，並以無菌技術開啟。
步驟三	先使用酒精消毒針劑藥物軟塞，並以無菌操作技術在乾淨區域準備注射藥物，不將多劑量包裝藥品帶到治療區。
步驟四	以無菌技術執行針劑注射。
步驟五	注射完畢後依尖銳物及感染性廢棄物處理流程安全的處理尖銳及感染性廢棄物。
步驟六	再次確實執行手部衛生。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"><li>● 單一劑量包裝或單次使用的小瓶裝、安瓿裝、瓶裝、袋裝靜脈注射藥品僅限單一病人使用。</li><li>● 多劑量包裝的藥品在首次開封後應標註開封日期、有效期限，並且在開封後 28 天內丟棄；若廠商說明書指示開封後可存放的天數比 28 天長或短，應依廠商說明使用。</li><li>● 僅量使用單劑量包裝，如果可能，多劑量包裝藥品最好僅提供給單一病人使用。</li><li>● 注射藥品使用的管路(tubing)和轉接器(connector)僅限單一病人使用。</li></ul>